

Les lichens de Haute-Savoie

Hypogymnia physodes (L.) Nyl.

Fiche préparée d'après :
- la fiche du site de l'AFL ;
- le catalogue en ligne des *Lichens de France* à télécharger sur le site de Claude Roux ;
- le *Guide des Lichens de France – Lichens des arbres*, Belin 2009, p.72



ID* : 1

photos Alain Millet ↑→

Classification : Lecanorales - Parmeliaceae

Groupement : *Pseudovernietum furfuraceae*

confusions possibles :

Hypogymnia farinacea : médulle P- et soralies envahissant le thalle
Hypogymnia tubulosa : lobes creux en tube, médulle P+ légèrement jaunâtre, soralies terminales comme un dé sur un doigt

sur le terrain

thalle foliacé, en rosette, jusqu'à 10 cm de Ø,

à lobes allongés se recouvrant les uns les autres, à extrémités ± bombées et redressées

face supérieure gris clair bleuâtre

face inférieure noire (sauf l'extrémité des lobes qui est brune), dépourvue de rhizines

soralies se développant au bout des lobes

[apothécies très rares]

substrat et préférences :

corticole
acidophile
photophile ou héliophile
non ou peu nitrophile.
jusqu'à l'étage subalpin

détails



réactions colorées :

à gauche, médulle KC+ brun rouge
au milieu, cortex : K+ jaune
à droite, médulle P+ rouge orangé



soralies terminales blanchâtres ou verdâtres labriformes**

* voir l'indice de déterminabilité sur le site

** voir le lexique

rédaction : 10 février 2019 - SHNPR