Les lichens de Haute-Savoie

Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav.

Fiche préparée d'après :
- la fiche du site de l'AFL ;
- le catalogue en ligne des *Lichens de France* à télécharger sur le site de Claude Roux ;
- le *Guide des Lichens de France – Lichens des arbres*, Belin 2009, p.72

ID* : 1 (facilement identifiable, en se méfiant toutefois de la confusion possible avec *Hypogymnia physodes*)

classification : *Lecanorales - Parmeliaceae*

groupement : *Pseudovernion furfuraceae*

sur le terrain

thalle foliacé, jusqu'à 10 cm de Ø, gris clair dessus et noir dessous, sans rhizine (brun à la bordure)

à lobes allongés, tubulaires et creux

extrémités des lobes redressées et gonflées, terminées d'abord en pointes émoussées, parfois brunes,
puis par une soralie** terminale, blanchâtre ou grisâtre, en doigt de gant

← photo Alain Millet

photo Françoise Drouard→

détails

réaction colorées
cortex : K+ jaune
médulle : KC+ brun rouge ; P- (ou un peu jaunâtre)

substrat et préférences

corticole,
sur tronc et branchettes
non ou peu nitrophile
acidophile
stations humides éclairées

confusions possibles avec d'autres lichens du 74

Hypogymnia farinacea : médulle P- (ou un peu jaunâtre), lobes plats, à soralies** laminales **

Hypogymnia physodes : médulle P+ rouge orangé, lobes un peu gonflés

*voir l'indice de déterminabilité sur le site

**voir le lexique

rédaction : 9 février 2019 – SHNPR