

Les lichens de Haute-Savoie

Rinodina bischoffii* (Hepp) A.Massal. subsp. *bischoffii

Fiche préparée d'après :
 - la fiche du site de l'AFL ;
 - le catalogue en ligne des *Lichens de France* à télécharger sur le site de Claude Roux ;
 - le *Guide des Lichens de France – Lichens des roches*, Belin 2016, p.222

sur le terrain

thalle crustacé, épilithique, mince, un peu pulvérulent, de couleur blanchâtre, gris clair ou gris brun,

apothécies nombreuses, de 0,3 à 1 mm de Ø, à disque brun foncé à noir, au début à disque plan et à rebord thallin grisâtre bien visible, ensuite à disque convexe avec un rebord tendant à disparaître

[aucune réaction colorée]

← photos Alain Millet →

détails



spores ellipsoïdales par huit, de 15-21 sur 9-14 µm, possédant une bande brune équatoriale dont la largeur est égale à environ le 1/3 de la longueur de la spore [de type *Bischoffii*]

préférences

saxicole, calcicole, surtout sur de petits blocs et des cailloux au sol, ainsi que sur le mortier

xérophile et photophile

commun, jusqu'au subalpin rarement à l'alpin

confusions possibles avec d'autres lichens du 74

Rinodina bischoffii subsp. *castanomelodes* : thalle épilithique, aréolé-fendillé, épais, brun gris jusqu'à brun foncé, parfois lobulé au pourtour ; apothécies à rebord thallin toujours saillant ; peu ou moyennement calcicole

Rinodina immersa : également calcicole, mais possédant des apothécies immergées dans le thalle



ID* : 3 (nécessité de vérifier les spores au laboratoire)

classification : Caliciales - Physciaceae

*voir l'indice de déterminabilité sur le site

**voir le lexique

rédaction : 9 février 2019 - SHNPR