

Flavoparmelia caperata (L.) Hale

Fiche préparée d'après :
 -la fiche du site de l'AFL ;
 -le catalogue en ligne des Lichens de France à télécharger sur le site de Claude Roux ;
 -le *Guide des Lichens de France – Lichens des arbres*, Belin 2009, p. 106.



ID* : 1 (2 au collinéen, nécessité de faire la réaction colorée)

Classification : Lecanorales – Parmeliaceae

Groupement : *Parmotremion perlatae*

sur le terrain

thalle foliacé en rosette, jaunâtre à jaune verdâtre à l'état humide, jusqu'à 50 cm de diamètre

← photo F. Drouard (le pied donne l'échelle)

lobes arrondis, relevés sur les bords centre de la face supérieure plus ou moins froncé et sorédié** (soralies **granuleuses, arrondies, jaunâtres)



[apothécies très rares]

substrat et préférences

écorce (tronc et branches) de feuillus, rarement sur conifères aimant la lumière acidophile ; non nitrophile jusqu'à l'étage montagnard où il est rare

détails



↑ face supérieure (photo Alain Millet)

← face inférieure (photo F. Drouard) noire, à marge brun clair, à rhizines simples, absentes sur la marge

[réaction colorée : médulle K + jaune]

confusions possibles avec d'autres lichens du 74

Parmelia soredians ne monte que jusqu'au collinéen, dans les zones chaudes : soralies farineuses et non granuleuses ; médulle K+ jaune puis rouge