

Les lichens de Haute-Savoie

Nephroma parile (Ach.) Ach.

Fiche préparée d'après :

- la fiche du site de l'AFL ;

- le catalogue en ligne des *Lichens de France* à télécharger sur le site de Claude Roux ;

- le *Guide des Lichens de France – Lichens des arbres*, Belin 2009, p. 76



sur le terrain

thalle foliacé gris brun à l'état sec, vert foncé à l'état humide

lobes arrondis, aux bords ascendants et ondulés portant des **soralies**** pustuleuses, de gris bleu à brun ; soralies d'abord marginales devenant laminales** →


[apothécies très rares]

[aucune réaction colorée ; parfois médulle K+ jaune]

[médulle blanche]

face inférieure non tomenteuse, mais éventuellement avec un très fin duvet, lisse à ridée, noirâtre au centre et roussâtre sur les bords →

photos Françoise Drouard



détails

substrat et préférences

sur écorce de feuillus ; sur mousse (sur écorce ou rochers calcifuges)

dans des forêts anciennes

du collinéen au subalpin

confusions possibles

Tous les *Nephroma* ont un thalle à *Nostoc* (noircissent à l'état humide) et des apothécies naissant sur la face inférieure terminale des lobes qui montent et se retournent. Chez les *Nephroma*, seul *parile* a des soralies. Généralement sans apothécie, *parile* pourrait être confondu avec : *Peltigera collina* (surface inférieure tomenteuse, à veines) ; *Sticta limbata* (surface inférieure tomenteuse, à cyphelles).

ID* : 2 ()

Classification : Lecanorales – Parmeliaceae

Groupement : *Lobarion pulmonariae*

*voir l'indice de déterminabilité sur le site

**voir le lexique

rédaction : 24 mars 2019 – SHNPR