
#### Les lichens de Haute-Savoie

# Nephroma resupinatum (L.) Ach.



**ID\***: 2 (observation de la face inférieure)

<u>Classification</u>: Lecanorales – Parmeliaceae

<u>Groupement</u>: *Lobarion pulmonariae* 

### sur le terrain

thalle foliacé gris brun à l'état sec, vert foncé à l'état humide, à surface irrégulière et plus ou moins tomenteuse

 $\leftarrow$  photo Alain Millet

lobes variables, parfois lobulés

apothécies naissant à la face inférieure des lobes qui finalement remontent et se retournent, montrant le disque chamois, assez plat

[aucune réaction colorée]

[médulle blanche]

face inférieure à feutrage beige, avec des verrues blanches (inférieures à 1 mm) - photo Françoise Drouard →

#### Fiche préparée d'après :

- la fiche du site de l'AFL;
- le catalogue en ligne des *Lichens de France* à télécharger sur le site de Claude Roux :
- le Guide des Lichens de France Lichens des arbres, Belin 2009, p.52

détails



## substrat et préférences

sur écorce de feuillus ; sur mousse (sur écorce ou rochers calcifuges)

dans des forêts anciennes

du collinéen au subalpin, mais surtout montagnard

confusions possibles

Tous les *Nephroma* ont un thalle à *Nostoc* (noircissent à l'état humide) et des apothécies à disposition particulière.

Chez les *Nephroma*, seul *resupinatum* a des verrues banches à la face inférieure.

\*voir l'indice de déterminabilité sur le site

\*\*voir le lexique

rédaction : 24 mars 2019 - SHNPR