

Parmelina pastillifera (Harm.) Hale

Fiche préparée d'après :
 -la fiche du site de l'AFL ;
 -le catalogue en ligne des Lichens de France à télécharger sur le site de Claude Roux ;
 -le livre *Guide des Lichens de France – Lichens des arbres*, Belin 2009, p. 58



sur le terrain

thalle foliacé gris, assez appliqué sur le substrat, à lobes à marges découpées mais **arrondies aux aisselles**

face supérieure gris clair un peu brillante, avec des **isidies**** noires surtout denses au centre du thalle, rétrécies à la base, élargies et rondes au sommet, laissant une **cicatrice** blanche à la cassure - photo Françoise Livet →

dessous noir, à rhizines noires simples

[apothécies peu fréquentes, non vues]

[réactions colorées : cortex K+ jaune et P- ; médulle C+ rouge et KC+ rouge]

← photos Alain Millet

détails



ID* : 2 (observation à la loupe nécessaire)

classification : Lecanorales – Parmeliaceae

groupement : *Pleurostiction acetabuli*



substrat et préférences

écorce, sur arbres feuillus isolés ou en forêts claires ; parfois sur rochers

légèrement nitrotolérant

étages collinéen et montagnard

confusions possibles avec d'autres lichens du 74

Les thalles jeunes (quelques cm) ne possédant pas encore d'isidies, on peut les confondre avec des thalles jeunes des deux autres *Parmelina*.

Parmelina quercina a des apothécies.

Parmelina tiliacea a des isidies ne laissant pas de cicatrice à l'arrachage.