

Parmelina quercina (Willd.) Hale

Fiche préparée d'après :

-la fiche du site de l'AFL ;

-le catalogue en ligne des Lichens de France à télécharger sur le site de Claude Roux ;

-le livre *Guide des Lichens de France – Lichens des arbres*, Belin 2009, p. 40



ID* : 2 (observation à la loupe nécessaire)

classification : Lecanorales – Parmeliaceae

groupement : *Pleurostiction acetabuli*

sur le terrain

thalle foliacé en rosette régulière, bien adhérent au substrat, à lobes courts à marge découpée, mais arrondie aux aisselles

face supérieure gris clair, mate ou un peu brillante

dessous noir, à **rhizines** noires simples, épaisses et courtes

apothécies fréquentes, à disque brun-rouge brillant, à rebord thallin épais avec des rhizines noires dessous


← photo J.-M. Sussey

photo F. Drouard →

[pas d'isidies]

[réactions colorées : cortex K+ jaune et P- ; médulle C+ rouge et KC+ rouge]

détails



substrat et préférences

écorce,
sur arbres feuillus isolés ou en forêt claire,
non ou un peu nitrophile
surtout à l'étage montagnard,
rarement au collinéen ou au subalpin inférieur

confusions possibles avec d'autres lichens du 74

Les thalles jeunes (quelques cm) des trois espèces communes en Haute-Savoie ne possédant pas encore d'isidies ou d'apothécies peuvent être confondus.

Sur les exemplaires âgés, *P. quercina* est la seule à ne pas posséder d'isidies, car on n'a pas encore trouvé *P. carporrhizans*, plus fréquente à l'étage méditerranéen, qui a un thalle maculé (loupe) et des rhizines longues et fines.