Les lichens de Haute-Savoie

Plastimatia glauca (L.) W.L. Culb. & C.F. Culb. morph. glauca

Fiche préparée d'après :
-la fiche du site de l'AFL ;
-le catalogue en ligne des Lichens de France à télécharger sur le site de Claude Roux ;
-le *Guide des Lichens de France – Lichens des arbres*, Belin 2009, p. 50

ID* : 2 (allure et couleur très caractéristiques ; nécessité de vérifier la réaction à l'iode)

sur le terrain

thalle foliacé très peu adhérent au substrat, de couleur gris bleuté , très mince

lobes larges mais souvent très découpés et contournés au bord, relevés et montrant la face inférieure brune, noire ou blanche

verdit beaucoup à l'eau

[apothécies très rares]

← photo J.-M. Sussey

photo Alain Millet →
isidies** marginales, simples à coralloïdes, grisâtres

détails



photo Françoise Livet ↑

réaction colorée :
médulle I+ bleu

Classification : Lecanorales – Parmeliaceae
Groupement : *Pseudevernion furfuraceae*

substrat et préférences

sur écorce de conifères et feuillus, aussi sur bois, sur rochers et très rarement au sol
aimant l'humidité
préférant l'acidité

étages collinéen et surtout montagnard et subalpin

confusions possibles avec d'autres lichens du 74

Platismatia glauca morpho. sorediosa n'est actuellement pas connu de Haute-Savoie.

Les thalles jeunes de *Platismatia glauca* peuvent éventuellement être confondus avec ceux de
Cetrelia olivetorum s. l., *Nephromopsis chlorophylla, Parmotrema perlatum* et *P. reticulatum*,
tous à médulle I-

*voir l'indice de déterminabilité sur le site

**voir le lexique

rédaction : 27 février 2019 - SHNPR