

Les lichens de Haute-Savoie

Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf

Fiche préparée d'après :

- la fiche du site de l'AFL ;
- le catalogue en ligne des Lichens de France à télécharger sur le site de Claude Roux ;
- le *Guide des Lichens de France – Lichens des arbres*, Belin 2009, p. 142



photo F. Drouard

thalle fruticuleux** buissonnant, en lanières souples de 1 à 10 mm de largeur, de couleur grise le plus souvent sur le dessus, à face inférieure canaliculée** et noirâtre (à maturité en partant de la base)

ID* : 1 (forme bien reconnaissable sur le terrain)

ID* : 2 (si on veut distinguer les deux chémotypes**)

Classification : Lecanorales – Parmeliaceae

Groupement : *Parmelietum sulcatae*

sur le terrain

isidies** concolores au thalle, situées sur la face supérieure et au bord des lanières, en nombre très variable, de taille et de largeur très variables (ce qui peut faire varier énormément l'aspect du thalle)

[apothécies peu fréquentes]

[réactions colorées de la médulle : C- et KC- = morpho. furfuracea
C+ et KC+ rouge = morpho. ceratea]

détails



face inférieure

photo A. Millet



face supérieure très isidiée

photo A. Millet

substrat et préférences

écorce (du tronc aux branchettes)
surtout sur résineux, aussi sur feuillus ; parfois sur bois, rarement sur rochers ou au sol

aime l'acidité, la lumière non ou peu nitrophile
du collinéen au subalpin

confusions possibles avec d'autres lichens du 74

avec d'autres lichens fruticuleux :

Evernia divaricata : rameaux étroits, souples, K-
Evernia prunastri : thalle K+ jaune ; confusion parfois possible à l'état jeune, seule différence, la face inférieure non canaliculée

Ramalina fraxinea : K- sur les deux faces, nombreuses apothécies
Ramalina farinacea : K- sur les deux faces, nombreuses soralies, souvent marginales

*voir l'indice de déterminabilité sur le site

**voir le lexique

rédaction : 25 février 2019 - SHNPR