


Les lichens de Haute-Savoie

*Hypogymnia farinacea* Zopf

Fiche préparée d'après :  
 - la fiche du site de l'AFL ;  
 - le catalogue en ligne des *Lichens de France* à télécharger sur le site de Claude Roux ;  
 - le *Guide des Lichens de France – Lichens des arbres*, Belin 2009, p.72



sur le terrain

← **thalle** foliacé, bien appliqué sur le substrat, mais peu adhérent ;  
 à lobes étroits (1-3 mm), allongés, plus ou moins convexes, se recouvrant les uns les autres, mais à extrémités plates, élargies et arrondies ;  
 à face supérieure gris clair (verdâtre ou jaunâtre) ;  
 à face inférieure sans rhizines, noire sauf aux extrémités des lobes qui sont brunes

**isidies soralifères** laminales\*\*,  
**KC+ jaune puis rouge** →

[médulle P-]

[apothécies très rares]

détails



**ID\* : 1** \* voir l'indice de déterminabilité sur le site

Espèces proches :

= *Hypogymnia physodes* : lobes creux et plats, médulle P+ rouge et soralies terminales farineuses labriiformes sur la face inférieure  
 = *Hypogymnia tubulosa* : lobes creux en tube, médulle P+ légèrement jaunâtre et soralies terminales comme un dé sur un doigt



substrat et préférences :

corticole (feuillu ou résineux)  
 acidophile  
 photophile ou héliophile  
 non ou peu nitrophile.  
 jusqu'à l'étage subalpin

Classification : Lecanorales - Parmeliaceae

Groupement : *Pseudevernetum furfuraceae*

\*\* voir le lexique

rédaction : 21 décembre 2019 - SHNPR