

Physconia distorta (With.) J. R. Laundon var. *distorta*

Fiche préparée d'après :

- la fiche du site de l'AFL ;
- le catalogue en ligne des Lichens de France à télécharger sur le site de Claude Roux ;
- Lichens des arbres* p. 46 – Belin 2009

sur le terrain



Thalle foliacé gris brun à sec, bien vert quand il est humide, à lobes rayonnants, se chevauchant, couverts de pruine blanche au moins aux extrémités

←photo Françoise Drouard

Apothécies nombreuses sur les thalles âgés, à disque brun noir mais avec une pruine blanche, à rebord thallin parfois lobulé, de 2 à 5 mm de diamètre

photo Alain Bénard→

Détail d'un thalle sec très pruineux donc presque entièrement blanc

photo Françoise Drouard→

Face inférieure noire, brunâtre au bord, avec de nombreuses **rhizines** noires

←photo Françoise Drouard

Jeune thalle non encore apothécié

[aucune réaction colorée]

classification : Caliciales – Physciaceae

groupement : *Pleurosticton acetabuli*

détails



substrat et préférences

confusions possibles avec d'autres lichens du 74

espèce commune, jusqu'au montagnard sur écorce d'arbres feuillus isolés plus ou moins nitrophile

ID* : 1 (ou **2** à cause d'un aspect variable)

Les quatre espèces corticoles présentes de manière avérée dans le département ne peuvent pas être confondues. Les caractères généraux du genre sont : thalle petit foliacé verdissant à l'eau ; cortex supérieur K- ; apothécies lécanorines** à disque foncé ; spores par 8, brunes, à une cloison.

rédaction : 16 décembre 2019 – SHNPR

**voir le lexique

*voir l'indice de déterminabilité sur le site