

Les lichens de Haute-Savoie

Sticta sylvatica (Huds.) Ach.

Fiche préparée d'après :
 -la fiche du site de l'AFL ;
 -le catalogue en ligne des *Lichens de France* à télécharger sur le site de Claude Roux ;
 -le *Guide des Lichens de France – Lichens des arbres*, Belin 2009, p. 54




sur le terrain

← **Thalle** foliacé (5-15 cm), en lobes allongés et assez étroits (0,5 à 1,5 cm de large), à ramifications plus ou moins dichotomes et aux extrémités tronquées

Odeur nette de poisson à l'état humide

Face inférieure brune, très feutrée, avec des cyphelles** blanches bien visibles



détails grossis



↑
 Face supérieure brune à l'état sec, plus foncée à l'état humide ; avec un réseau en relief portant des isidies courtes, coralloïdes, brunes et délimitant de petites foveoles**ovales

Photos Françoise Drouard

[pas de réaction colorée]

[apothécies inconnues]

substrats et préférences

Surtout sur le tronc de vieux arbres feuillus, dans des forêts anciennes, humides et ombragées. Espèce assez rare
 Grande sensibilité à la pollution de l'air.
 Jusqu'au montagnard.
Groupement : *Lobarion pulmonariae*

confusion possible avec d'autres lichens du 74

ID* : 1 ou 2 * voir l'indice de déterminabilité sur le site
 L'espèce *Sticta fuliginosa*, dans les mêmes milieux, a des lobes plus larges, moins divisés et des foveoles encore moins nettes, avec des isidies sur toute la surface supérieure. Cependant les thalles jeunes des deux espèces peuvent être confondus.

Classification : Peltigerales - Lobariaceae

** voir le lexique

rédaction le 20 décembre 2019 – SHNPR