

Les lichens de Haute-Savoie

Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg

Fiche préparée d'après : - la fiche du site de l'AFL et le catalogue en ligne des *Lichens de France* à télécharger sur le site de Claude Roux ;
- *Guide des Lichens de France – Lichens des arbres* - Belin – 2009 – p. 88
- *Nordic Lichen Flora* Vol. 2 Physciaceae – 2002 – p. 31



← aspect du lichen sec sur un tronc de marronnier en ville

Thalle foliacé mat gris verdâtre ou brunâtre, plus ou moins foncé, orbiculaire, assez petit (jusqu'à 3 cm de diamètre), bien appliqué.

Lobes allongés, se divisant au bout, se recouvrant peu, bien rayonnants.

Soralies** maculiformes, assez globuleuses (sauf quand elles sont érodées), laminales**, souvent groupées au centre, à granulations verdâtres, blanchâtres et noirâtres, K-.

Face inférieure noire au centre, plus claire au bord, avec des rhizines simples, noires ou noires à pointe blanche ou blanches, assez nombreuses, dépassant un peu du thalle

[apothécies rares]

- photos Françoise Drouard -



← thalle humide, bien vert

ID* : 2

(une loupe à main suffit)

Seule espèce corticole de *Phaeophyscia* à soralies maculiformes laminales.
Au collinéen, peut être confondue avec *Hyperphyscia adglutinata* aux rhizines plus courtes et peu nombreuses.

Substrat et préférences

Surtout sur écorce, mais aussi saxicole et sur mortier (tout support plutôt calcaire et riche en nitrates).

Supportant une pollution assez forte.

Jusqu'au subalpin.

Classification : Cyclocarpales – Physciaceae

* voir l'indice de déterminabilité sur le site

** voir le lexique

rédaction : 8 mars 2020 - SHNPR