

Les lichens de Haute-Savoie

***Brodoa atrofusca* (Schaer.) Goward**



**ID\* : 2** (reconnaissance à vue + examen à la loupe à main – pour vérifier l'espèce, il faut faire la réaction KC sur la médulle)

Confusions possibles : avec *Brodoa intestiformis* qui a beaucoup de lobes secondaires étroits, des apothécies le plus souvent et une réaction KC de la médulle négative.

Classification : Lecanorales – Parmeliaceae

Groupement : *Umbilicarion cylindrica*e

Substrat et préférences : saxicole, calcifuge – en situation exposée – du montagnard supérieur à l'alpin – nitrophile.

\*voir l'indice de déterminabilité sur le site

Fiche préparée d'après :

- la fiche du site de l'AFL ;
- le catalogue en ligne des *Lichens de France* à télécharger sur le site de Claude Roux ;
- le *Guide des Lichens de France – Lichens des roches*, Belin 2016, p. 54

sur le terrain

◀ **Thalle** foliacé, en rosette, gris, bien appliqué mais pas très adhérent au support. Lobes assez étroits, convexes, sinueux, imbriqués.

Extrémités des lobes ►  
élargies, plus claires et  
brunes au bord

[Apothécies rares]

←photos Françoise Drouard→

**Pycnides\*\*** ►  
noires, nombreuses

**Réaction KC\*\***  
sur la médulle : rose ►

détails



\*\*voir le lexique

rédaction : 15 mars 2023 – SHNPR