

Les lichens de Haute-Savoie	
<i>Usnea intermedia</i> (A. Massal) Jatta	
	Fiche préparée d'après : - la fiche du site de l'AFL ; - le catalogue en ligne des <i>Lichens de France</i> à télécharger sur le site de Claude Roux ; - le <i>Guide des Lichens de France – Lichens des roches</i> , Belin 2016, p. 54
	sur le terrain ◀ Thalle fruticuleux filamenteux, gris verdâtre, buissonnant à subpenduleux, atteignant parfois 30 cm Ramifications sympodiales **▶ Surface sans soralies, avec de nombreux petits tubercules et de nombreuses fibrilles ; avec fissures  ▲ Coupe transversale d'une ramification : Cordon blanc compact : 20 à 40 % Médulle homogène aérée : 20 à 30 % Cortex : moins de 10 % Apothécies ▶ Marge pourvue de fibrilles <u>Substrat et préférences</u> : corticole, sur conifères et feuillus – du montagnard au subalpin – non nitrophile, aérohygrophile, photophile.
	détails  
	confusions possibles confusion avec <i>Usnea florida</i> possible aux plus basses altitudes du département, levée par l'action de P sur le disque de l'apothécie : <i>florida</i> P+ jaune ; <i>intermedia</i> P-
ID* : 2 Classification : Lecanorales – Parmeliaceae Groupement : <i>Usneetum dasopogae</i> Photos ©Françoise Drouard	
*voir l'indice de déterminabilité sur le site **voir le lexique rédaction : 20 avril 2025 – SHNPR	