


Val d'Isère, observations hors botanique

Session botanique du 7 au 10 juillet 2025.

Carte des lieux visités.....	2	<i>Sphecidae</i> , Spécidés (Famille des Apocrites).....	30
Liste des observations hors botanique	3	<i>Orthoptera</i> ; Sauterelles et Grillons, Criquets	31
Photos des espèces observées	13	<i>Acrididae</i> , Criquets	31
<i>Araneae</i> , Araignées	13	<i>Lepidoptera</i> ; Lépidoptères, partie Rhopalocères.....	34
<i>Opiliones</i> , Opilions	14	<i>Hesperiidae</i> , Hespéries.....	34
Champignons	16	<i>Pieridae</i> , Piérides.....	35
<i>Boletales</i> > <i>Boletaceae</i> , Bolets	16	<i>Lycaenidae</i> , Lycénidés	37
Lichens	17	<i>Nymphalidae</i> , Nymphalidés	40
<i>Lecanorales</i>	17	<i>Lepidoptera</i> ; Lépidoptères, partie Hétérocères	51
<i>Pertusariales</i>	18	<i>Geometroidea</i> > <i>Geometridae</i> , Géomètres	51
<i>Coleoptera</i> , Coléoptères.....	19	<i>Noctuoidea</i> > <i>Erebidae</i> , Érébidés	54
<i>Chrysomelidae</i> , Chrysomèles.....	19	<i>Noctuoidea</i> > <i>Noctuidae</i> , Noctuelles	55
<i>Carabidae</i> , Carabes.....	20	<i>Pterophoroidea</i> > <i>Pterophoridae</i> , Ptérophores.....	56
<i>Curculionidae</i> , Charançons	20	<i>Bombycoidea</i> > <i>Sphingidae</i> , Sphinx .	59
Diptera, Mouches (Au sens large)	22	<i>Tortricoidea</i> > <i>Tortricidae</i> , les Tordeuses	60
<i>Bombyliidae</i> , Bombyles	22	<i>Zygaenoidea</i> > <i>Zygaenidae</i> , Zygènes	60
<i>Muscidae</i> , Musidés	23		
<i>Scathophagidae</i> , Scathophagidés...	23		
<i>Syrphidae</i> , Syrphes	24		
<i>Tachinidae</i> , Tachinidés	25		
<i>Tipulidae</i> , Tipules (Cousins)	26		
<i>Hemiptera</i> ; Cigales, Pucerons, Cochenilles et Punaises (<i>Heteroptera</i>).....	27		
<i>Cercopidae</i> , Cercopes.....	27		
<i>Pentatomidae</i> , Pentatomidés.....	27		
<i>Hymenoptera</i> ; Symphytes, Abeilles, Guêpes, Frelons et Fourmis	29		
<i>Apidae</i> , Abeilles (au sens large avec les bourdons...)	29		
<i>Formicidae</i> , Fourmis	29		

Carte des lieux visités



	Jour et couleur trace GPS	Lieux
1	1 ^{er} jour pm (vert fluo)	Centre > La Bua > Vers La Bouclia
2	2 ^{ème} jour am (bleu)	Centre > Marais de la Daille
3	2 ^{ème} jour pm (orange)	Pont Saint-Charles (Rte du Col de l'Iseran)
4	3 ^{ème} jour am (bleu foncé)	Centre > Chapelle Sainte-Lucie
5	3 ^{ème} jour am (jaune)	Col de l'Iseran (côté Notre-Dame de l'Iseran), Bonneval-sur-Arc
6	4 ^{ème} jour am et début pm (bleu foncé)	Col de l'Iseran (côté Télésiège de Céma)
7	4 ^{ème} jour pm arrêt station fin séjour	Descente début du col côté Bonneval-sur-Arc vers Ruisseau du Touvet. (Pas de trace, juste point 7)

am pour matin et pm pour après-midi

Liste des observations hors botanique

Pour les lieux : derrière le jour, a pour matin et p pour après-midi.

Groupe	Ordre	Famille	Sous-Famille	Tribu	Genre / espèce	Noms vernaculaires	Notes	Lieux	
Araignées, Acariens, Opilions	Araneae	Araneidae			Aculepeira ceropegia	Épeire des bois, Épeire feuille de chêne	Toile orbiculaire entre les herbes. Hab. :Prairies et les buissons bas (en particulier les genêts) en lisière de forêts.	J1	
		Lycosidae			Pardosa	Lycose	Chasse à l'affût.	J3p	
	Opiliones	Phalangiiidae			Mitopus glacialis		Hab. :En altitude, aux abords des rochers et des éboulis bien exposés.	J4p	
					Mitopus morio	Faucheur Morio	Ra. :Insectes, fluides végétaux, champignons, charognes, excréments d'oiseaux. Hab. :Bruyère, landes, forêt, prairie, jardin.	J2a	
Champignons	Boletales	Boletaceae			Suillellus luridus (=Boletus luridus, Boletus rubeolarius)	Bolet blafard	Habitat : Sous feuillus et conifères (plutôt sous feuillus et en milieu calcaire).	J2p	
Lichens	Lecanorales	Cladoniaceae			Stereocaulon vesuvianum var. nodulosum		Habitat : Saxicole, sur roches non calcaires	J4a	
		Parmeliaceae			Nephromopsis nivalis		Habitat : Terricole, ou détriticole. Pelouses alpines, rases, bien exposées à tous les temps y compris le vent et la neige, bien éclairées et bien ensoleillées. Étages montagnard supérieur (rare), subalpin et alpin.	J3p	

Groupe	Ordre	Famille	Sous-Famille	Tribu	Genre / espèce	Noms vernaculaires	Notes	Lieux		
	Pertusariales	Icmadophilaceae			Thamnolia vermicularis		Habitat : Sur sol, surtout acidophile, entre les mousses et les herbes dans toutes les régions de haute montagne et froides du globe.	J3p		
Insectes (Hors Lépidoptères)	Coléoptères	Carabidae	Cicindelinae	Cicindelini	Cicindela gallica	Cicindèle des Alpes	Hab. :Pentes, talus et éboulis ensoleillés, de l'étage montagnard à l'alpin.	J1	J4a	
		Chrysomelidae	Chrysomelinae	Doryphorini	Oreina sp.			J3a		
		Curculionidae	Entiminae	Phyllobiini	Phyllobius sp.			J3a		
			Lixinae	Lixini	Larinus sp.			J2p		
	Diptera	Bombyliidae				Hemipenthes maura	Anthracine morio	Ra. :Adultes de nectar et de pollen, larves parasites d'autres larves et chenilles. Hab. :Endroits secs et ensoleillés.	J1	
		Muscidae				Mesembrina meridiana	Mésembrine de midi	Ra. :Larves coprophages ; Adultes nectar. Hab. :Lisière des bois, broussailles, le long des pâturages des vaches, sur les fleurs, les troncs exposés au soleil, les palissades, les excréments.	J3a	
		Scathophagidae	Scathophaginae			Scathophaga sp.			J3a	
		Syrphidae	Syrphinae	Syrphini	Episyrphus balteatus	Syrphe ceinturé	Ra. :Adultes pollen, de nectar et de miellat ; larves pucerons et larves de Tenthredinidae. Hab. :divers.	J1		
		Syrphidae	Syrphinae	Syrphini	Scaeva pyrastris	Syrphe du poirier, Syrphe pyrastre	Ra. :Larves pucerons ; Adultes nectar. Hab. :divers dépendant de la présence de pucerons.	J1	J3a	
		Syrphidae	Syrphinae	Syrphini	Eupeodes sp.				J4p	

Groupe	Ordre	Famille	Sous-Famille	Tribu	Genre / espèce	Noms vernaculaires	Notes	Lieux	
		Tachinidae	Exoristinae	Eryciini	Phryxe magnicornis =(Tachina magnicornis)	Échinomie à pieds roux	Ra. : Larves sont endoparasites de chenilles de noctuelles ; Imago nectar et pollen.	J1	
			Tachininae	Macquartiini	Macquartia sp.			J1	
		Tipulidae			Tipula lunata	Tipule à ailes cendrées avec une tache blanche cendrée	Ra. :Larves racines. Adulte à vie très brève.	J3a	
	Hemiptera	Cercopidae	Cercopinae	Cercopini	Cercopis sanguinolenta	Cercepe sanguin	Ra. :Insecteur piqueur/suceur de sève. Hab. :Très diverses.	J1	
							Hab. :régions boisées, les herbes et les plantes sauvages des talus bien exposés.		
		Pentatomidae	Pentatominae	Pentatomini	Dolycoris baccarum	Punaise brune à antennes & bords panachés	Ra. :Insecteur piqueur/suceur de fruits et graines de plantes. Hab. :Très diverses.	J1	
							Ra. :Insecteur piqueur/suceur de fruits fleurs et bourgeons d'arbres et arbuste. Hab. :Arbres et arbustes dans les régions boisées humides et fraîches.		
	Strachiini	Eurydema rotundicollis	Eurydème Alpine	Ra. :Insecteur piqueur/suceur de brassicacées. Hab. :Montagne à partir 1900 m.	J4p				
	Hymenoptera	Apidae	Apinae	Bombini	Bombus mesomelas	Bourdon élégant	Hab. :Versants ensoleillés des montagnes (montagnard à alpin). Ra. :pollen et nectar.	J2p	
Formicidae		Myrmicinae	Myrmicini	Manica rubida		Hab. :Plutôt les sols sableux des zones inondables. Ra. :Insectes et miellats.	J1		
Sphecidae		Ammophilinae		Podalonia sp.			J1		

Groupe	Ordre	Famille	Sous-Famille	Tribu	Genre / espèce	Noms vernaculaires	Notes	Lieux	
	Orthoptera	Acrididae	Gomphocerinae	Gomphocerini	Gomphocerus sibiricus	Gomphocère des alpages, Criquet de Sibérie	Ra. :Graminées à feuilles fines. Hab. :Pelouses et pâturages alpins, landes et boisements clairs, étage montagnard à alpin.	J4p	
			Melanoplinae	Melanoplini	Melanoplus frigidus	Miramelle des frimas	Ra. :Graminées à feuilles larges. Hab. :Pelouses et pâturages alpins, landes et boisements clairs, étage montagnard à alpin. Hab. :En altitude, pelouses alpines, éboulis et alpages, landes à Rhododendrons.	J4a	
				Podismini	Podisma sp.			J1	
Lépidoptères, Rhopalocères	Lepidoptera	Hesperiidae		Pyrgini	Pyrgus carlinae	Hespérie de la Parcinière (L'), Hespérie de la Carline (L'), Carlin (Le)	ZNIEFF. Ra. :Chenille sur Benoîte des montagnes, Potentilles. Hab. :Prairies pelouses fleuries >=700 et <=2500.	J3a	
				Hesperiini	Thymelicus lineola	Hespérie du Dactyle (L'), Ligné (Le), Hespérie orangée (L')	Ra. :Chenille sur Graminées. Hab. :Prairies clairières herbeuses <=2300.	J3a	
					Thymelicus sylvestris	Hespérie de la Houque (L')	Ra. :Chenille sur Graminées. Hab. :Prairies clairières herbeuses <=2200.	J1	
		Pieridae		Anthocharini	Euchloe simplonia	Piérade du Simplon (La), Piérade de la Roquette (La)	Ra. :Chenille sur Brassicacées (Crucifères). Hab. :Pelouses, prairies, lits de torrents >=600 et <=2600.	J2a	
				Pierini	Pieris bryoniae	Piérade de l'Arabette (La), Piérade de la Bryone (La)	ZNIEFF. Ra. :Chenille sur Brassicacées (Crucifères). Hab. :Lisières, clairières, prairies humides >=700 et <=2700.	J3a	

Groupe	Ordre	Famille	Sous-Famille	Tribu	Genre / espèce	Noms vernaculaires	Notes	Lieux		
					Pontia callidice	Piéride du Vêlar (La), Veiné-de-vert (Le), Piéride callidice (La)	ZNIEFF. Ra. :Chenille sur petites Brassicacées (Crucifères). Hab. :Éboulis, pelouses rocheuses >=1500 et <=3400.	J4p		
		Lycaenidae		Polyommataini	Aricia artaxerxes	Argus de l'Hélianthème (L'), Argus marron (L')	Ra. :Chenille sur Hélianthèmes. Hab. :Pelouses, prairies >=400 et <=2500.	J1		
						Cyaniris semiargus	Azuré des Anthyllides (L'), Demi-Argus (Le)	Ra. :Chenille sur Trèfles. Hab. :Prairies et champs de trèfles <=2500.	J1	J4p
						Lysandra coridon	Argus bleu-nacré (L')	Ra. :Chenille sur Trèfles Hab. :Prairies et champs de trèfles <=2500.	J1	
						Plebejus idas OU P. argus	Azuré du Genêt (L') OU Azuré de l'Ajonc (L')	Ra. :Chenille surtout sur Fabacées. Hab. :Landes, prairies, pelouses <=2400.	J1	J3a
		Nymphalidae		Argynniini	Boloria pales ou B. napae	Nacré subalpin (Le) OU Nacré des Renouées (Le)	Ra. :Chenille sur Viola sp. Hab. :Pelouses de l'étage montagnard à alpin.	J4a	J4p	
						Boloria titania	Nacré porphyrin (Le), Alezan (L'), Jason (Le), Grande Violette (La)	Ra. :Chenille sur Bistorta officinalis (Renouée bistorte). Hab. :Lisières et clairières, landes, prairies humides >=800 et <=2300.	J1	J3a
						Brenthis ino	Nacré de la Sanguisorbe (Le), Nacré des marais (Le), Nacré de la Reine-des-prés (Le)	ZNIEFF. Chenille sur Filipendula ulmaria (Reine des prés), plus rarement Comarum palustre (Comaret). Hab. :Prairies humides, tourbières, clairières et lisières localement sur pelouses sèches <=2200.	J3a	
						Fabriciana niobe	Chiffre (Le)	Ra. :Chenille sur Viola sp. Hab. :Prairies, pelouse, landes, lisières et clairières fleuries <=2500.	J1	

Groupe	Ordre	Famille	Sous-Famille	Tribu	Genre / espèce	Noms vernaculaires	Notes	Lieux
					Speyeria aglaja	Grand Nacré (Le), Aglagé (L'), Moyen-Nacré (Le)	Ra. :Chenille sur Viola sp. Hab. :Prairies, pelouse, landes, lisières et clairières <=2500.	J1
				Melitaeini	Euphydryas aurinia	Damier de la Succise (Le), Artémis (L')	LRR (NT), PN et ZNIEFF. Chenille sur Scabieuses, Gentianes et Chèvrefeuilles. Hab. :Pelouse sèches, prairies, tourbières, clairières <=2600.	J4a
			Euphydryas cynthia		Damier de l'alchémille (Le), Mélitée alpestre (La)	LRR (NT) et ZNIEFF. Chenille sur Plantago sp. (plantains) et Véronique d'allioni. Hab. :Pelouse et prairies >=1500 et <=2100.	J4a	
			Melitaea diamina		Mélitée noirâtre (La), Damier noir (Le)	Ra. :Chenille sur Valérianes ; Prairies humides, tourbières, lisières et clairières, pentes rocheuses <=2250.	J1	
			Nymphalini		Aglais urticae	Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit-Renard (Le)	Ra. :Chenille sur Valérianes. Hab. :Prairies humides, tourbières, lisières et clairières, pentes rocheuses <=2250.	J3a
				Vanessa atalanta	Vulcain (Le), Amiral (L')	Ra. :Chenille sur Orties. Hab. :Lisières, clairières, prairies, vergers, parcs, jardins <=2600.	J3a	
				Satyrini	Coenonympha gardetta	Satyrion (Le), Philéa (Le)	ZNIEFF. Ra. :Chenille sur Graminées. Hab. :Prairies, pelouses >=1200 et <=2400.	J1
			Erebia alberganus		Moiré lancéolé (Le), Satyre Céto (Le)	ZNIEFF. Ra. :Chenille sur Graminées. Hab. :Prairies , clairières >=800 et <=2200.	J1	
			Erebia euryale		Moiré frange-pie (Le), Moiré frangé (Le)	ZNIEFF. Ra. :Chenille sur Graminées. Hab. :Clairières et lisières, bois clairs, landes d'altitude >=800 et <=2500.	J3a	

Groupe	Ordre	Famille	Sous-Famille	Tribu	Genre / espèce	Noms vernaculaires	Notes	Lieux		
Lépidoptères, Hétérocères					Erebia gorge	Moiré chamoisé (Le), Satyre Gorgé (Le)	Ra. :Chenille sur Graminées. Hab. :Pierriers >=1600 et <=3100.	J4p		
					Erebia pandrose	Moiré cendré (Le), Grand Nègre bernois (Le)	Ra. :Chenille sur Graminées. Hab. :Pelouses et pentes rocheuses >1600 et <=2800.	J4a		
		Geometridae (Super famille Geometroidea)		Gnophini	Charissa sp.				J2c	
				Macariini	Chiasmia clathrata	Réseau (Le), Géomètre à barreaux (La)	Ra. :Chenille sur Fabacées (légumineuses). Hab. :friches, les prairies, les dunes.	J1		
				Perizomini	Perizoma albulata	Périzome du Rhinanth (La)	Ra. :Chenille consommant fleurs et capsules du Petit rhinanth (Rhinanthus minor). Hab. :Lieux herbus, lisières, talus, prairies, de la plaine à l'étage subalpin.	J1		
				Scopulini	Scopula immorata	Acidalie hardie (L')	Ra. :Chenille consommant le feuillage fané de diverses plantes basses. Hab. :Prairies sèches, adrets plutôt humides, lisières.	J1		
					Scopula incanata	Acidalie grisonnante (L')	Ra. :Chenille sur diverses plantes basses, dont l'origan, le serpolet, la campanule et les œillets.. Hab. :Escarpements rocheux, broussailles, dunes, jusqu'à plus de 2000m.	J1		
				Xanthorhoini	Xanthorhoe montanata	Mélanthie montagnarde (La)	Ra. :Chenille sur diverses plantes basses, plantain, oseille, primevère... Hab. :Prairies, lisières, haies, de la plaine à l'étage subalpin.	J1		
		Erebidae		Arctiini	Arctia plantaginis	Ecaille du Plantain (L')	Ra. :Chenille sur diverses plantes basses (Plantago, Hieracium, ...).	J1		

Groupe	Ordre	Famille	Sous-Famille	Tribu	Genre / espèce	Noms vernaculaires	Notes	Lieux	
							Hab. :bois clairs, les friches, les prairies plutôt humides.		
				Euclidiini	Euclidia glyphica	Doublure jaune (La)	Ra. :Chenille essentiellement sur fabacées (lotiers, trèfles, luzernes...). Hab. :Prairies sèches à mésophiles, les clairières.	J1	
				Lithosiini	Setina aurita	Ecaille alpine (L'), Endrosie crépitante (L')	Ra. :Chenille sur Lichens saxicoles. Hab. :Pierriers et prairies rocailleuses jusqu'à 3000m.	J4a	J4p
		Noctuidae		Eriopygini	Eriopygodes imbecilla	Mythimne imbécile (La)	Ra. :Chenille principalement sur Myrtille Vaccinium myrtillus), de Gaillet de bruyère (Galium saxatile), Knautia et Lamium. Hab. :Prairies humides, fraîches.	J1	
				Leucaniini	Leucania comma	Comma blanc (Le)	Ra. :Chenille sur Poacées (Graminées). Hab. :Prairies humides, fraîches, lisières de forêt, pâturages.	J1	
		Pterophoridae		Platyptiliini	Stenoptilia sp.	Ptérophore		J1	
		Crambidae		Crambini	Catoptria conchella	Crambus coquille	Ra. :Chenille sur Mousses des rochers et des troncs. Hab. :Lisières et prairies accidentées de l'étage subalpin..	J1	
				Odontiini	Metaxmeste phrygialis	Hercyne rupicole	Ra. :Chenille sur divers plantes basses. Hab. :Pelouses alpines.	J3p	J4a
				Pyraustini	Pyrausta aerealis	Pyrauste olivacée commune	Ra. :Chenille sur divers plantes basses surtout Serpolet et Teucrium montanum (Germandrée des montagnes). Hab. :Prairies et pelouses bien exposées jusqu'à 2700 m.	J1	

Groupe	Ordre	Famille	Sous-Famille	Tribu	Genre / espèce	Noms vernaculaires	Notes	Lieux	
					Pyrausta despicata	Pyrauste du plantain	Ra. :Chenille sur Plantago (Plantains), Salvia (Sauges) et Antennaria (Pieds de chat). Hab. :Prairies, pelouses alpines, côteaux herbus.	J4a	
				Udeini	Udea lutealis	Botys alpestre	Ra. :Chenille sur de nombreuses plantes basses. Hab. :Prairies, pelouses alpines, dans l'étage subalpin.	J1	
		Sphingidae		Macroglossini	Macroglossum stellatarum	Moro-Sphinx (Le), Sphinx du Caille-Lait (Le)	Ra. :Chenille principalement sur Gaillets (Galium), mais aussi Rubiaceae, Valerianaceae ou Caryophyllaceae. Hab. :Migrateur. Prés, buissons, jardins.	J4p	
		Tortricidae		Eucosmini	Zeiraphera griseana	Tordeuse du Mélèze (La)	Ra. :Chenille dans les aiguilles de Mélèze. Périodiquement grande pullulation occasionnant un jaunissement spectaculaire des Mélèzes. Hab. :Là où il y a des Mélèzes.	J3a	
		Zygaenidae			Zygaena exulans	Zygène des sommets (La), Zygène des alpages (La)	Ra. :Chenille sur Éricacées. Hab. :Montagne entre 1800 et 3000 m.	J4a	J4p
								Observation de nombreuses chenilles pendues à un fil sur <i>Sorbus aucuparia</i> (Sorbier des oiseleurs).	J3a

(Cliquez pour voir la *Carte des lieux visités*)

Lieux	
1er jour pm (vert fluo)	Centre > La Bua > Vers La Bouclia
2ème jour am (bleu)	Centre > Marais de la Daille
2ème jour pm (orange)	Pont Saint-Charles (Rte du Col de l'Iseran)
3ème jour am (bleu foncé)	Centre > Chapelle Sainte-Lucie
3ème jour am (jaune)	Col de l'Iseran (côté Notre-Dame de l'Iseran), Bonneval-sur-Arc
4ème jour am et début pm (bleu foncé)	Col de l'Iseran (côté Télésiège de Céma)
4ème jour arrêt station fin séjour	Descente début du col côté Bonneval-sur-Arc vers Ruisseau du Touvet. (Pas de trace, juste point 7)

Abréviations utilisées

Hab.	Habitat
Ra.	Régime alim.
Pl.	Plante hôte

Statuts


LRN (niv)	Liste Rouge Nationale (niveau UICN)
LRR (niv)	Liste Rouge Régionale (niveau UICN)
PN	Protection nationale
ZNIEFF	Espèce indicatrice de ZNIEFF

Niveau du statut UICN

Disparue au niveau régional	RE
En danger	EN
En danger critique d'extinction	CR
Quasi menacée	NT
Vulnérable	VU

Photos des espèces observées

Araneae, Araignées



Aculepeira ceropegia, Épeire des bois, Épeire feuille de chêne.
♂ (Pédipalpes en « gants de boxe »)



Aculepeira ceropegia, Épeire des bois, Épeire feuille de chêne.
♂ (Pédipalpes en « gants de boxe »)

Opiliones, Opilions

Corps d'un seul tenant (pas de distinction entre tête, céphalothorax et abdomen).



Mitopus morio,
Faucheur Morio (Le)



Champignons

Boletales > *Boletaceae*, Bolets



Suillellus luridus, Bolet blafard



Suillellus luridus, Bolet blafard

Lichens

Lecanorales

Cladoniaceae, Cladonicées

Stereocaulon vesuvianum
var. *nodulosum*



Parmeliaceae, Parméliacées

Nephromopsis nivalis



Pertusariales

Icmadophilaceae, Icmadophilacés

Thamnozia vermicularis




Coleoptera, Coléoptères

Chrysomelidae, Chrysomèles

Oreina sp.



Oreina sp.



Carabidae, Carabes

Cicindela gallica,
Cicindèle des Alpes (La)



Curculionidae, Charançons

Larinus sp.




Phyllobius sp.



Diptera, Mouches (Au sens large)

Bombyliidae, Bombyles

Hemipenthes maura,
Anthracine morio (L')



Hemipenthes maura,
Anthracine morio (L')



Muscidae, Musidés

Mesembrina meridiana,
Mésembrine de midimaura



Scathophagidae, Scathophagidés

Adultes et larves saprophages , coprophages, zoophages ou phytophages.

Scathophaga sp.



Syrphidae, Syrphes

Les syrphes sont des pollinisateurs très importants.



Eupeodes sp.



Tachinidae, Tachinidés

Phryxe magnicornis
=(*Tachina magnicornis*),
Échinomie à pieds roux



Macquartia sp.



Tipulidae, Tipules (Cousins)

Tipula lunata, Tipule à ailes cendrées avec une tache blanche cendrée



Hemiptera ; Cigales, Pucerons, Cochenilles et Punaises (*Heteroptera*)


Cercopidae, Cercopes

Cercopis sanguinolenta,
Cercope sanguin




Pentatomidae, Pentatomidés

Dolycoris baccarum,
Punaise brune à antennes
& bords panachés



Eurydema rotundicollis,
Eurydème alpine



Hymenoptera ; Symphytes, Abeilles, Guêpes, Frelons et Fourmis


Apidae, Abeilles (au sens large avec les bourdons...)

Eurydema rotundicollis,
Eurydème alpine



Formicidae, Fourmis

Manica rubida, une
fourmi rouge de
montagne



Sphecidae, Spécidés (Famille des Apocrites)

Podalonia sp.



Orthoptera ; Sauterelles et Grillons, Criquets

Acrididae, Criquets

Gomphocerus sibiricus, Gomphocère
des alpages, Criquet de Sibérie



Gomphocerus sibiricus, Gomphocère
des alpages, Criquet de Sibérie



Melanoplus frigidus,
Miramelle des frimas



Podisma sp.




Podisma sp.



Lepidoptera ; Lépidoptères, partie Rhopalocères

Hesperiidae, Hespéries





Thymelicus sylvestris, Hespérie de la Houque (L'), Thaumás (Le), Bande noire (La)

Pieridae, Piérides



Chenille d'*Euchloe simplonia* ; Piéride du Simplon (La), Piéride de la Roquette (La)

Pieris bryoniae, Piéride de l'Arabette (La),
Piéride de la Bryone (La)



Pontia callidice, Piéride du Vêlar (La), Veiné-
de-vert (Le), Piéride callidice (La)



Pontia callidice, Piéride du Vêlar (La), Veiné-de-vert (Le), Piéride callidice (La)



Lycaenidae, Lycénidés



Cyaniris semiargus, Azuré des Anthyllides (L'), Demi-Argus (Le)

Cyaniris semiargus, Azuré des Anthyllides (L'),
Demi-Argus (Le)



Lysandra coridon, Argus bleu-nacré (L')





Plebejus idas OU *P. argus*, Azuré du Genêt (L') OU Azuré de l'Ajonc (L')




Plebejus idas OU *P. argus*, Azuré du Genêt (L') OU Azuré de l'Ajonc (L')

Plebejus sp, (*P. argus* ou *P. idas*)

Nymphalidae, Nymphalidés

Boloria pales ou *B. napae*, Nacré subalpin (Le) OU Nacré des Renouées (Le)



Boloria titania, Nacré porphyrin (Le), Alezan (L'), Jason (Le), Grande Violette (La)






Boloria titania, Nacré porphyrin (Le),
Alezan (L'), Jason (Le), Grande Violette
(La)



Brenthis ino, Nacré de la Sanguisorbe
(Le), Nacré des marais (Le), Nacré de la
Reine-des-prés (Le)



Brenthis ino, Nacré de la Sanguisorbe (Le), Nacré des marais (Le), Nacré de la Reine-des-prés (Le)



Fabriciana niobe, Chiffre (Le)



Speyeria aglaja, Grand Nacré (Le),
Aglaré (L'), Moyen-Nacré (Le)



Euphydryas aurinia, Damier de la
Succise (Le), Artémis (L')




Euphydryas cynthia, Damier de l'alchémille (Le), Mélitée alpestre (La)



Melitaea diamina, Mélitée noirâtre (La), Damier noir (Le)

Chenille d'Aglais urticae, Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit-Renard (Le)



Vanessa atalanta, Vulcain (Le), Amiral (L')




Coenonympha gardetta, Satyrion (Le),
Philéa (Le)



Erebia alberganus, Moiré lancéolé (Le),
Satyre Céto (Le)



Erebia alberganus, Moiré lancéolé (Le),
Satyre Céto (Le)



Erebia euryale, Moiré frange-pie (Le),
Moiré frangé (Le)



Erebia euryale, Moiré frange-pie (Le),
Moiré frangé (Le)



Erebia gorge, Moiré chamoisé (Le),
Satyre Gorgé (Le)



Erebia gorge, Moiré chamoisé (Le),
Satyre Gorgé (Le)



Erebia pandrose, Moiré cendré (Le),
Grand Nègre bernois (Le)



Erebia pandrose, Moiré cendré (Le),
Grand Nègre bernois (Le)

Lepidoptera ; Lépidoptères, partie Hétérocères

Geometroidea > *Geomitridae*, Géomètres



Charissa sp.



Chiasmia clathrata, Réseau (Le),
Géomètre à barreaux (La)



Perizoma albulata, Périzome du Rhinanthé (La)



Scopula immorata, Acidalie hardie (L')



Scopula incanata, Acidalie
grisonnante (L')



Xanthorhoe montanata,
Mélanthie montagnarde (La)

Noctuoidea > Erebidae, Érébidés



Arctia plantaginis, Écaille du Plantain (L')



Euclidia glyphica, Doublure jaune (La)



Setina aurita, Écaille alpine (L'),
Endrosie crépitante (L')

Noctuoidea > Noctuidae, Noctuelles¹



Eriopygodes imbecilla,
Mythimne imbécile (La)

¹ Les Noctuelles sont des papillons de la famille des *Noctuidae* mais elle comprend aussi certaines Érébidées.

Leucania comma, Comma
blanc (Le)



Pterophoroidea > Pterophoridae, Ptérophores

Stenoptilia sp.





Catoptria conchella, Crambus
coquille



Metaxmeste phrygialis, Hercyne
rupicole



Pyrausta aerealis, Pyrauste olivacée commune



Pyrausta despicata, Pyrauste du plantain



Bombycoidea > Sphingidae, Sphinx




Tortricoidea > Tortricidae, les Tordeuses



Zygaenoidea > Zygaenidae, Zygènes

Zygaena exulans (sur la neige),
Zygène des sommets (La),
Zygène des alpages (La)





*Cocons de Zygaena exulans,
Zygène des sommets (La),
Zygène des alpages (La)*